

# 病害虫防除技術情報第 1 号

平成 22 年 4 月 6 日

三重県病害虫防除所

## コムギ赤かび病の防除は、 開花始めから開花盛期に行いましょう

- 1 対象作物： コムギ
- 2 対象病害名： 赤かび病
- 3 生育状況

コムギの出穂は平年並～やや早い見込みです。

本年は播種期間が長くなったことから、生育差が大きく、出穂および開花時期がばらつくと予想されます。

- 4 防除対策

コムギ赤かび病の防除適期は開花始めから開花盛期です。

開花前の薬剤散布は防除効果が劣ります。

下表の出穂期予測を目安として、圃場ごと・品種ごとに出穂および開花状況を把握し、適期防除を行ってください。

### 出穂期予測

(出穂期の約 7～10 日後に開花始めとなります)

地域	品種	播種時期			
		11/10	11/20	11/30	12/10
伊勢 平坦部	農林 61 号	4/12	4/17	4/20	4/23
	あやひかり	4/9	4/14	4/17	4/20
	ニシノカオリ	4/8	4/13	4/16	4/19
	タマイズミ	4/10	4/15	4/18	4/21
伊賀地域	タマイズミ	4/22	4/27	5/1	5/5

開花期以後に降雨が続き、気温が高く推移した場合は追加防除を行いましょう。