

各 位

防 除 第 12 号
令和 3 年 5 月 20 日

三重県病害虫防除所長

令和3年度病害虫発生予報第2号

このことについて、下記のとおり発表します。

1. 向こう 1 か月の予報と対策

1) 作物

イネでは、葉いもちの発生時期はやや早、発生量はやや多と予想されます。発生を見かけたら速やかに防除してください。イネクロカムシの発生量は平年並と予想されます。イネミズゾウムシの発生時期は平年並、発生量はやや少と予想されます。

2) 果樹

カンキツでは、かいよう病(中晩柑)、黒点病、チャノキイロアザミウマの発生量は平年並と予想されます。そうか病、かいよう病(温州みかん)、ミカンハダニの発生量はやや少と予想されます。

ナシでは、黒星病の発生量はやや多と予想されます。降雨が続く場合は予防的に防除を実施してください。ハダニ類の発生量は平年並と予想されます。

ブドウでは、べと病の発生量はやや多と予想されます。降雨が続く場合は予防的に防除を実施してください。

目 次

| | ページ |
|-----------------------|-----|
| 1. 向こう 1 か月の予報と対策 | 1 |
| 2. 作物別の状況 | 2 |
| 3. 発生時期・発生量(平年比)の予察根拠 | 7 |
| 4. 予察項目の見方 | 12 |
| 5. 気象のデータ | 13 |
| 6. おしらせ | 15 |

果樹共通では、カムシ類の発生量はやや少と予想されます。

3) 茶

チャでは、もち病、チャノホソガの発生量は平年並、炭疽病、カンザワハダニ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマの発生量はやや少と予想されます。

4) 野菜

イチゴでは、炭疽病、うどんこ病の発生量は平年並と予想されます。

ネギでは、ネギコガの発生量はやや少と予想されます。

野菜共通では、コナガの発生量は平年並と予想されます。

515-2316 三重県松阪市嬉野川北町 530

TEL 0598-42-6365 Fax 0598-42-7568

ホームページ <http://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/index.htm>











1 農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。

2. 作物別の状況

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | | 要防除圃場率 | 発生消長の一例 | | | | 防除の注意事項 |
|------------------|----------|------|-----|----|--------|---------|-------|-------|-----|---|
| | | | | | | 5月 | 6月 | | | |
| | | 平年比 | 平年比 | 程度 | 平年比 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| イネ | 葉いもち | やや早 | やや多 | 小 | 普通 | 置苗で発生 | | 本田で発生 | | 1) 補植用置き苗は発生源となるので、速やかに除去し、枯死させてください。 2) 本田粒剤による予防は、初発前に行ってください。 3) いもち病発生予測支援システム(プラスタム)において、感染好適条件の現れた7~10日後に初発が予測されます。 4) プラスタムの最新情報は、病害虫防除所ホームページで随時更新しています。 |
| | イネクロカメムシ | — | 平年並 | 小 | 普通 | | 成虫誘殺数 | | 被害量 | 1) 常発地で薬剤散布する場合は、越冬成虫の発生量がピークになる6月下旬に実施してください。 |
| | イネミズゾウムシ | 平年並 | やや少 | 小 | 低 | 成虫誘殺数 | | | | 1) 株当たり0.5頭以上の成虫が発生していれば、防除してください。 |
| カ ン キ ツ | そうか病 | — | やや少 | 小 | 普通 | 葉・枝 | | 果実 | | 1) 梅雨明けまで幼果に感染します。 2) 6月以降は新芽や幼果の病斑から二次感染するので、予防散布が重要です。 |
| | 黒点病 | — | 平年並 | 小 | 普通 | 発病程度 | | | | 1) 生理落果盛期~後期に予防散布を実施してください。 2) 上記薬剤散布後、積算で200mm以上の降雨があったら次の防除を実施してください。 3) 枯枝が伝染源です。梅雨時期の枯枝発生に注意し、樹冠内や圃場内の枯枝を除去してください。 |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | | 要防除圃場率 | 発生消長の一例 | | | | 防除の注意事項 |
|------|-------------|------|-------------------------|----------------|----------------------|---------|----|----|----|--|
| | | | | | | 5月 | 6月 | | | |
| | | 平年比 | 平年比 | 程度 | 平年比 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| カンキツ | かいよう病 | — | 温州 やや少 中晩柑 平年並 | 温州 小 中晩柑 | 温州 低 中晩柑 普通 | 発病程度 | | | | 1) 旧葉で越冬病斑が見られる圃場では、感染を助長する降雨等の気象条件に注意し、ボルドー剤による予防防除を実施してください。 2) 越冬病斑が見られない圃場でも、本病に弱い品種(カラ、セミノールなど)では、幼果への感染防止対策として予防散布を実施してください。 3) 中晩柑類では、梅雨期頃から10月中下旬頃まで果実への感染が起ります。 |
| | ミカンハダニ | — | やや少 | 中 | 普通 | 雌ダニ密度 | | | | 1) 梅雨期は薬剤散布のタイミングが取りにくい時期です。マシン油乳剤等を有効に利用する散布を計画して下さい。 2) 発生密度が高い圃場では、散布ムラのないように十分に薬剤散布してください。 3) 薬剤抵抗性発達を回避するため、同一系統薬剤使用は年1回として下さい。 |
| | チャノキイロアザミウマ | — | 平年並 | 小 | 普通 | 成虫密度 | | | | 1) 例年被害の多い圃場では6月上旬～中旬に防除し、その後は30日間隔を目安に次回の防除を行ってください。 |
| ナシ | 黒星病 | — | やや多 | 中 | 普通 | 発病程度 | | | | 1) 圃場内をよく観察し、発病が認められる場合は速やかに防除を実施してください。 2) 発病葉は発見次第取り除き、圃場外へ持ち出して処分してください。 3) 薬剤耐性菌を生ずる恐れがあるため同一系統薬剤の連用を避けてください。 |
| | ハダニ類 | — | 平年並 | 小 | 普通 | 雌ダニ密度 | | | | 1) 防除の目安は成虫の1葉当たり寄生頭数が1頭以上の時です。 2) 薬剤抵抗性発達を回避するため、同一系統薬剤使用は年1回として下さい。 |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | | 要防除圃場率 | 発生消長の一例 | | | | 防除の注意事項 |
|------|-------|------|-----|----|--------|---------|----|----------------|-------------|---|
| | | | | | | 5月 | 6月 | | | |
| | | 平年比 | 平年比 | 程度 | 平年比 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| ブドウ | ベと病 | — | やや多 | 小 | 普通 | 発病程度 | | | | 1) 雨が続くと急激に発生が広がります。降雨が予想される時は、早めに予防散布を行ってください。 2) 葉裏をよく観察し、病斑を認めたら直ちに防除を実施してください。 3) 被害葉、被害果穂は発見次第取り除き、圃場外に持ち出し処分してください。 |
| 果樹共通 | カメムシ類 | — | やや少 | 小 | 低 | | | チャバネアオカ メムシ | ツヤアオカム シ | 1) 降雨がなく気温の高い夜に飛来が多いので、夜間の街灯に注意したり、圃場を見回るなどして、早期発見に努めてください。 2) 山林に近い圃場では特に注意が必要です。 3) 薬剤散布はカメムシ類の飛来を確認してから実施してください。 4) 夕刻から活発に飛翔するので朝夕の薬剤散布が効果的です。 5) 合成ピレスロイド系の薬剤を連続して散布すると、ハダニ類、カイガラムシ類の発生が多くなる傾向があるので注意してください。 |
| チヤ | 炭疽病 | — | やや少 | 小 | 普通 | 発病 | 感染 | | 発病 | 1) 気温が 25°C 前後で降雨時間が長く湿潤であると多発します。 2) 6月上旬頃の気象によっては感染が助長されるので注意してください。 3) 旧葉に病斑葉が多いところでは注意してください。 4) 開葉初期に防除してください。 |
| | もち病 | — | 平年並 | 小 | 低 | 発病 | 感染 | | 発病 | 1) 気温が低い(15~22°C)と多発します。 2) 山間地など日陰になりやすいところでは、降雨により感染が多くなります。 3) 萌芽期が防除適期です。 |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | | 要防除圃場率 | 発生消長の一例 | | | | 防除の注意事項 |
|---------|--------------|------|-----|----|--------|---------|---|--|--|--|
| | | | | | | 5月 | 6月 | | | |
| | | 平年比 | 平年比 | 程度 | 平年比 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| チャ ヤ | カンザワハダニ | — | やや少 | 小 | 普通 | 雌ダニ密度 |  |  |  | 1) 世代交代が早く、急増があるので、発生密度の低い時期に防除してください。 2) 葉裏に生息していますので丁寧に散布してください。 3) 天敵への影響の小さい薬剤を選択してください。 4) 薬剤抵抗性が発達しやすいので、同一系統の薬剤の連用は避けてください。 |
| | チャノホソガ | — | 平年並 | 中 | 普通 | 成虫密度 |  |  |  | 1) 防除適期は孵化直後の潜葉期(幼虫による絵描き状態)です。 2) 成虫の飛来状況と新芽への産卵状況(水滴状の卵)に注意してください。 3) 成虫の飛来状況は、病害虫防除所のホームページを参考にしてください。 |
| | チャノミドリヒメヨコバイ | — | やや少 | 小 | 普通 | 成虫密度 |  |  |  | 1) 成虫で越冬し、新芽の伸長とともに発生が増加します。 2) 新芽を加害し、先端から褐変して落葉することもあります。 3) 二番茶の萌芽期～開葉初期に防除してください。 |
| | チャノキイロアザミウマ | — | やや少 | 小 | 低 | 成虫密度 |  |  |  | 1) 成虫で越冬し、新芽の葉の組織内に産卵し、加害します。 2) 二番茶の萌芽前～開葉初期に防除してください。 |
| イチゴ | うどんこ病 | — | 平年並 | 中 | 普通 | 親株発病程度 |  |  |  | 1) 今後 1 か月は感染しやすい時期です。圃場をよく観察し、早期発見に努め、発病葉は適切に処分してください。 2) 育苗圃で発生が多いと本圃でも多発するため、親株の時期から薬剤防除を徹底し、健全苗を育成してください。特にハウスで発生が多くなることがあるので注意して下さい。 3) 薬剤耐性菌を生ずる恐れがあるため、同一系統薬剤の連用は避けてください。 |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | | 要防除圃場率 | 発生消長の一例 | | | | 防除の注意事項 |
|------|------|------|-----|----|--------|---------|------------|----|----|---|
| | | | | | | 5月 | 6月 | | | |
| | | 平年比 | 平年比 | 程度 | 平年比 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| イチゴ | 炭疽病 | — | 平年並 | 中 | 普通 | | 親株 発病程度 | | | 1) 高温・多湿条件で発生しやすいため、今後の梅雨・高温期にかけては注意が必要です。 2) 薬剤による予防防除を徹底してください。 3) 罹病株は感染源となります。見つけ次第速やかに除去し、圃場外に持ち出して処分してください。 4) 水滴の跳ね返りによって病原菌が広がります。灌水時は、跳ね返った水滴が茎葉に当たらないよう注意してください。 |
| ネギ | ネギコガ | — | やや少 | 小 | 普通 | 成虫密度 | | | | 1) 春から秋にかけて4～5回発生します。 2) 幼虫が葉の内部に潜り、表皮を残して食害するため、潜入防止のための早期防除が重要です。 |
| 野菜共通 | コナガ | — | 平年並 | 中 | 普通 | 成虫密度 | | | | 1) 近年、大きな被害は見られませんが、繁殖力が旺盛なアブラナ科野菜の重要な害虫です。 2) 中・老齢幼虫は殺虫効果が低くなるので、若齢のうちに防除してください。 3) 薬剤抵抗性が発達しやすいので、同一系統薬剤の運用は避けてください。 |

3. 発生時期・発生量(平年比)の予察根拠

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 平年比 | 発生量 平年比 | 予察根拠 |
|------------------|----------|-------------|------------|---|
| イネ | 葉いもち | やや早 | やや多 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 東海地方の今年の梅雨入りは5月16日と平年より21日早く、ブラスタムの感染好適日初日も早い (-) 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、置き苗での発生率0%(平年0%)、本田での発生圃場率0%(平年0%)と、平年並に少(±) 4) 一般圃場では、発生量は無で平年並(±)</p> <p>考察:今後の気象条件から予想発生量はやや多と考えます。</p> |
| | イネクロカメムシ | - | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 予察灯(水田位置・松阪市)における誘殺数は、昨年8月第2半旬～10月第6半旬では34頭(平年28.7頭)と平年並、本年4月第1半旬～5月第3半旬では0頭(平年0.2頭)と平年並に少(±)</p> <p>考察:昨年と本年の水田予察灯の誘殺状況から、予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| | イネミズゾウムシ | 平年並 | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 予察灯(水田位置・松阪市:4月第1半旬～5月第3半旬)では、越冬成虫の初飛来日は4月30日(平年4月29日)と平年並。誘殺数は15頭(平年32.2頭)とやや少(発生時期±、発生量-) 2) 巡回調査圃場(5月第2週)では、発生圃場率29.4%(平年45.9%)と少、被害株率8%(平年14.5%)と少、株当たり虫数0.01頭(平年0.03頭)と少(-) 3) 一般圃場での発生量は無～やや少(概して少)(-)</p> <p>考察:予察灯の状況から幼虫の予想発生時期は平年並、巡回調査結果、一般圃場の状況から、予想発生量はやや少と考えます。</p> |
| カ ン キ ツ | そうか病 | - | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 県予察圃(5月14日、無防除)では、新葉発病率51.0%(平年69.2%)と少、発病果率12.5%(平年8.5%)とやや多(±) 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、旧葉発病度0(平年0.02)と少(-) 4) 一般圃場では、発生量は少(-)</p> <p>考察:一般圃場の発生状況から、現状の発生量は少と考えられますが、今後の気象条件を考慮して予想発生量はやや少と考えます。</p> |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 平年比 | 発生量 平年比 | 予察根拠 |
|------------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| カ ン キ ツ | 黒点病 | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 県予察圃(無防除区)では、昨年10月上旬の果実発病度は94.8(平年78.1)で多 (+) 3) 巡回調査圃場では、昨年10月上旬の果実発病度10.3(平年10.6)と平年並 (±) 4) 感染源となる枯枝は平年並 (±)</p> <p>考察: 平年と比べて大きな増減の要因はなく、予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| | かいよう病 | — | 温州 やや少 中晩柑 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 県予察圃(5月14日、新甘夏、無防除)では、新葉発病率0%(平年0%)と平年並に少 (±) 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、旧葉発病度は温州みかんでは0%(平年0.03%)と平年並に少、中晩柑類では2.1%(平年2.2%)と平年並 (±) 4) 一般圃場では、発生量は平年並 (±)</p> <p>考察: 温州みかんでは、現状の発生量は少と考えられますが、今後の気象条件を考慮して予想発生量はやや少と考えます。中晩柑類では、現状の発生量は平年並と考えられ、引き続き予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| | ミカンハダニ | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (±) 2) 県予察圃(5月14日)では、100葉当たり寄生頭数は、無防除区0頭(平年31.8頭)と少、慣行防除区0頭(平年1.3頭)と少 (—) 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、旧葉寄生率3.1%(平年6.3%)と少、寄生頭数0.1頭/葉(平年0.71頭/葉)と少 (—) 4) 一般圃場では、発生量は少～平年並(概してやや少) (—)</p> <p>考察: 一般圃場の発生状況から、発生量はやや少と考えられ、引き続き予想発生量はやや少と考えます。</p> |
| | チャノキイロアザミウマ | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (±) 2) 県予察圃における5月上旬の黄色粘着トラップ誘殺数0.4頭/日(平年値0.9頭/日)とやや少 (—) 3) 一般圃場では、発生量は平年並 (±)</p> <p>考察: 一般圃場の発生状況から、現状の発生量は平年並と考えられ、引き続き予想発生量は平年並と考えます。</p> |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 平年比 | 発生量 平年比 | 予察根拠 |
|------|-------|-------------|------------|---|
| ナシ | 黒星病 | — | やや多 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 東海地方の今年の梅雨入りは5月16日と平年より21日早い (+) 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、発病葉率0%(平年0.4%)と少 (-) 4) 一般圃場では、発生量はやや少 (-)</p> <p>考察: 現状の発生量はやや少と考えられますが、今後の気象条件を重視して予想発生量はやや多と考えます。</p> |
| | ハダニ類 | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (±) 2) 巡回調査圃場(5月第2週)では、寄生葉率0%(平年0.04%)と平年並に少 (±) 3) 一般圃場では、発生量は少 (-)</p> <p>考察: 現状の発生量は平年並に少と考えられ、引き続き予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| ブドウ | ベと病 | — | やや多 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 東海地方の今年の梅雨入りは5月16日と平年より21日早い (+) 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、発病葉率は0%(平年0%)と平年並に少 (±) 4) 一般圃場では、発生量は少 (-)</p> <p>考察: 現状の発生量は平年並に少と考えられますが、今後の気象条件を重視して予想発生量はやや多と考えます。</p> |
| 果樹共通 | カメムシ類 | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 予察灯(御浜町・5月1日～10日)では、誘殺数はチャバネアオカメムシ11頭(平年299.4頭)と少、ツヤアオカメムシ297頭(平年1304.5頭)と少 (-) 2) 予察灯(畠・松阪市:5月第1半旬～第3半旬)では、誘殺数はチャバネアオカメムシ7頭(平年536頭)と少、ツヤアオカメムシ5頭(平年36.9頭)と少 (-) 3) フエロモントラップ(5月第2週)では、チャバネアオカメムシ誘殺数は、山地(津市白山町川口)で33.6頭(平年52.3頭)と少、中間地(津市白山町二本木)で34.3頭(平年96.2頭)と少、平坦地(松阪市嬉野川北町)で2.8頭(平年49.3頭)と少 (-) 4) フエロモントラップ(5月第2週)では、ツヤアオカメムシ誘殺数は、山地(津市白山町川口)で0頭(平年4.4頭)と少、中間地(津市白山町二本木)で0頭(平年3.6頭)と少、平坦地(松阪市嬉野川北町)で0.7頭(平年5.4頭)と少 (-) 5) 巡回調査圃場(5月第2週、カンキツ圃場)では、叩き落し虫数0頭(平年0.2頭)と少 (-) 6) 一般圃場では、発生量はやや少～平年並(概してやや少) (±)</p> <p>考察: 一般圃場の発生状況から現状の発生量はやや少と考えられ、引き続き予想発生量はやや少と考えます。</p> |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 平年比 | 発生量 平年比 | 予察根拠 |
|-----|--------------|-------------|------------|---|
| チヤ | 炭疽病 | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 県予察圃(一番茶期)では、発生は未確認 (±) 3) 巡回調査圃場(5月第1週)では、新葉発病葉数 0葉／m²(平年 0.04葉／m²)と少 (-) 考察: 現状の発生量は少と考えられ、今後の気象条件を考慮し予想発生量はやや少と考えます。</p> |
| | もち病 | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (+) 2) 県予察圃(一番茶期)では、発生は未確認 (±) 3) 巡回調査圃場(5月第1週)では、新葉発病枚数 0枚(平年 0枚)と平年並に少 (±) 考察: 現状の発生量は平年並と考えられ、引き続き予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| | カンザワハダニ | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (±) 2) 県予察圃(5月上旬)では、寄生葉率 1.0%(平年 4.1%)と少、寄生頭数 0.01 頭／葉(平年 0.15 頭／葉)と少 (-) 3) 巡回調査圃場(5月第1週)では、発生圃場率 14.3%(平年 40.0%)と少、寄生葉率 0.4%(平年 4.1%)と少、寄生頭数 0.007 頭／葉(平年 0.09 頭／葉)と少 (-) 4) 一般圃場では、発生量は少 (-) 考察: 現状の発生量は少と考えられ、今後の気温の上昇を考慮し予想発生量はやや少と考えます。</p> |
| | チャノホソガ | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (±) 2) 県予察圃(4月第3半旬～5月第2半旬)では、フェロモントラップ誘殺数 398.3 頭(平年 216.7 頭)と多 (+) 3) 巡回調査圃場(5月第1週)では、巻葉数 0.20 枚／m²(平年 0.57 枚／m²)とやや少 (-) 4) 一般圃場では、発生量は平年並 (±) 考察: 一般圃場を重視し現状の発生量は平年並と考えられ、予想発生量は引き続き平年並と考えます。</p> |
| | チャノミドリヒメヨコバイ | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量が多い予想 (±) 2) 県予察圃(4月第3半旬～5月第2半旬)では、黄色粘着トラップ捕殺数 6.2 頭(8年平均 7.1 頭)と平年並の傾向 (±) 3) 巡回調査圃場(5月第1週)では、叩き落とし虫数 0頭(平年 0.8 頭)と少 (-) 4) 一般圃場では、発生量は少 (-) 考察: 現状の発生量はやや少と考えられ、予想発生量は引き続きやや少と考えます。</p> |

| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 平年比 | 発生量 平年比 | 予察根拠 |
|------|-------------|-------------|------------|---|
| チャヤ | チャノキイロアザミウマ | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、気温は高く、降水量は多い予想（±） 2) 県予察圃(4月第3半旬～5月第2半旬)では、黄色粘着トラップ捕殺数28.1頭(8年平均49.7頭)とやや少の傾向（-） 3) 巡回調査圃場(5月第1週)では、叩き落とし虫数0頭(平年1.4頭)と少（-） 4) 一般圃場では、発生量は少（-） 考察: 現状の発生量はやや少と考えられ、引き続き予想発生量はやや少と考えます。</p> |
| イチゴ | うどんこ病 | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、平年に比べ平均気温は高く、降水量は多い予想（±） 2) 一般圃場では、発生量は少～平年並(概してやや少)（-） 考察: 現状の発生量はやや少と考えられ、今後の発病における適温条件を考慮して予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| | 炭疽病 | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、平年に比べ平均気温は高く、降水量は多い予想（+） 2) 一般圃場では、発生量は平年並に少（±） 考察: 現状の発生量は平年並に少と考えられ、今後の気象条件を考慮して予想発生量は平年並と考えます。</p> |
| ネギ | ネギコガ | — | やや少 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、平年に比べ平均気温は高く、降水量は多い予想（±） 2) 昨年12月上旬～2月下旬の平均気温は、7.3°C(平年6.2°C)と高く、越冬量が多いとみられる（+） 3) 巡回調査圃場(5月第2週)では、被害葉率0%(平年0%)と平年並に無（±） 4) 一般圃場では、発生量は無（-） 考察: 冬期の気温が高めに経過し、今後発生量が増加することが見込まれることから予想発生量はやや少と考えます。</p> |
| 野菜共通 | コナガ | — | 平年並 | <p>要因</p> <p>1) 1か月予報(5月13日発表)によると、平年に比べ平均気温は高く、降水量は多い予想（±） 2) 県予察圃フェロモントラップ(4月第3半旬～5月第2半旬)では、誘殺数5頭(平年18.6頭)と少（-） 3) 一般圃場では、発生量は少～平年並(概してやや少)（-） 考察: 現状の発生量はやや少と考えられるが、今後フェロモントラップにおいて誘殺数が増加する時期にあたることから、予想発生量は平年並と考えます。</p> |

4. 予察項目の見方

1)「作物別の状況」の見方

発生時期(平年比): 平年の発生月日からの差を「早、やや早、平年並、やや遅、遅」の5段階評価で予測します。ただし、発生時期が毎年大きく変化する病害虫では、日数の基準が下記より大きくなります。発生時期を予察する意義の小さい病害虫では予察しません。

| 日数 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 平年 発生日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|----|----|----|-----|----|-----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 評価 | 早 | | やや早 | | 平年並 | | やや遅 | | 遅 | | | | | |

発生量(平年比): 発生密度の平年値からの差を「少、やや少、平年並、やや多、多」の5段階評価で予測します。平年値との比較なので、平年値が小さければ、「多」になつても見かけの密度は多くないことがあります。毎年多発生している場合は「平年並」や「やや少」でも見かけ上は多いと感じことがあります。



A bell-shaped curve is drawn over a grid of six columns. The center column is labeled '平年並' (Average). The first and last columns are labeled '少' (Less), the second and fifth columns are labeled 'やや少' (Slightly Less), and the third and fourth columns are labeled '20%'.

| 度数 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 評価 | 少 | やや少 | 平年並 | やや多 | 多 | |

発生量(程度): 発生程度を「小、中、大、甚」の4段階評価で予測します。評価の基準値は病害虫毎に異なりますが、大雑把には、「見た目の多さ・少なさ」です。甚になるほど見た目は多くなり、小になるほど見た目は少なくなります。「発生量(平年比)」と比べることによって、「平年並に発生程度が小さい」「発生程度は大きいが平年並の発生量である」「平年より多いが、発生程度は小さい」「平年よりやや少ないが、依然として発生程度は中くらいである」等のように判断してください。

べることによって、「平年並に発生程度が小さい」「発生程度は大きいが平年並の発生量である」「平年より多いが、発生程度は小さい」「平年よりやや少ないが、依然として発生程度は中くらいである」等のように判断してください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 小 | 中 | 大 | 甚 |
|---|---|---|---|

要防除圃場率(平年比): 防除の必要性の目安を「低、普通、高」の3段階評価で予測します。「普通」であれば、県下の大半の圃場では防除暦に沿った通常の防除が必要と予想されます。「高」であれば、防除時期の見直しや追加防除などが必要になると予想されます。「低」であれば、防除回数を減らせるか、防除しなくとも済むと予想されます。

| | | |
|---|----|---|
| 低 | 普通 | 高 |
|---|----|---|

発生消長の一例: 発生予報は向こう1か月の予報ですが、その前後を合わせて40日ほどの病害虫の発生消長の一例をグラフで示します。大まかな目安として利用してください。

防除の注意事項: 向こう1か月の病害虫の特性と防除に関する説明です。

2)「発生時期・発生量(平年日)の予察根拠」の見方

(±): 平年並の要因

(+): 発生量増加または発生時期遅延の要因

(-): 発生量減少または発生時期早期化の要因

5. 気象のデータ

東海地方 1か月予報(令和3年5月13日 名古屋地方気象台発表)

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。特に、期間の前半はかなり高くなる可能性があります。低気圧や前線の影響を受けやすいため、向こう1か月の降水量は多く、日照時間は少ないでしょう。

| | |
|--------------------------|---|
| 1週目 5月15日～ 21日 | 天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。 |
| 2週目 5月22日～ 28日 | 天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。 |
| 3～4週目 5月29日～6 月11日 | 天気は数日の周期で変わるでしょう。 |

東海地方週間天気予報(令和3年5月17日16時36分 名古屋地方気象台発表)

予報期間 5月18日から5月24日まで




向こう一週間は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。なお、21日頃は前線の活動の程度によっては、大雨となるおそれがあります。







最高気温は、平年並か平年より低い日が多いですが、期間のはじめと終わりは平年より高い所もある見込みです。

最低気温は、平年並か平年より高く、期間の中頃にかけてはかなり高い日もあるでしょう。

降水量は、平年より多いか、かなり多い見込みです。

気象の日別推移(気象庁発表データ <http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php> から作成) (5月10日まで)





凡例

- 平均
- 最高
- 最低
- - - 年平均
- - - 年最高
- - - 年最低

凡例

- 31日
- 旬10日目
- 旬9日目
- 旬8日目
- 旬7日目
- 旬6日目
- 旬5日目
- 旬4日目
- 旬3日目
- 旬2日目
- 旬1日目
- 旬平年値

6. おしらせ (前回と異なる項目には NEW の印があります)

1) 記載基準の注意点

平年ほとんど発生のないか非常に少ない病害虫については、平年並に少ない発生状態の「発生量平年比」を「平年並」、「発生量程度」を「小」と記述しています。

レスからお入りください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000835764.pdf>

2) 発表日 NEW

本年度の病害虫発生予報は次の予定で発表します。

| | |
|------------------|------------------|
| 第1回 4月22日(木)(済み) | 第2回 5月20日(木)(今回) |
| 第3回 6月24日(木) | 第4回 7月20日(火) |
| 第5回 8月26日(木) | 第6回 10月21日(木) |
| 第7回 3月24日(木) | |

3) 利用方法

全部または一部をコピーして回覧・配布にご利用ください。ただし必ずページの右下にある「三重県病害虫防除所」の文字が入るようにしてください。

病害虫防除所ホームページには、この予報をはじめとして、不定期に発表される警報、注意報、特殊報、技術情報や、各種のグラフ、写真も載っています。下記のアドレスからお入りください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/index.htm>

このホームページはフリーリンクです。リンクする場合、事前の承諾申請等は不要ですが、事後で結構ですのでメールにてご一報いただけます。

5) メール配信サービス

予報、警報、注意報、特殊報、技術情報が発表されたときに、ホームページに掲載されたことを「掲載通知」として電子メールでお知らせしています。このメールの配信を希望される方は、下記のアドレスからお申し込みください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/39475007379.htm>

6) 農薬登録状況の最新情報

農薬の販売や使用に当たっては、農薬登録上の制限があります。農薬の使用時はラベルをよく読んでください。次のインターネットサイトでは、最新の農薬登録状況が確認できます。

三重県農薬情報システム

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/mie>

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの「農薬登録情報提供システム」

http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm

7) IPM(総合的病害虫・雑草管理)実践指標について

三重県では IPM を実践する上で必要な農作業の具体的な取組内容を示した作物別の指標を公表しています。農業者の皆さんのが取組について、現状把握と今後の気づきにご活用ください。病害虫防除所ホームページにリンクを設定しています。

三重県農林水産部農産園芸課ホームページ内

<http://www.pref.mie.lg.jp/NOAN/HP/80301022763.htm>

4) 本冊子の利用の手引き書

本冊子の見方を説明した「病害虫発生予報利用の手引き」があります。下記のアド

三重県病害虫防除所