

病虫害防除技術情報第1号

令和7年6月20日
三重県病虫害防除所

**クビアカツヤカミキリによるものと疑われるフラスが
ウメで確認されました。**

1 病虫害名：クビアカツヤカミキリ

2 発生確認作物：ウメ

3 発生確認地域：北勢地域

4 発生確認の経過

(1) 2025年6月に、北勢地域のウメ4本において、大量のフラス排出が確認されました。形状などから、クビアカツヤカミキリのフラスであると強く疑われます。

(2) 現在分析中ですが、今回のフラスがクビアカツヤカミキリによるものと断定された場合は、本県の果樹生産園地における被害初確認です。

(3) クビアカツヤカミキリは2019年に木曽岬町、2024年に桑名市と四日市市の街路樹および公園のサクラにおいて寄生が確認されています。他県ではモモ、スモモ、ウメ等の果樹で、木が枯死する等の被害が確認されています。

5 本種の特徴および被害状況

(1) 成虫は全体に光沢のある黒色で、赤い胸部と長い触角が特徴です。体長は2.5cmから4cmです(図1)。

(2) 幼虫が入り込んだ樹木からは、ひき肉状につながったフラス(フンと木くず、図2)が排出されます。フラスを拡大すると、均一な大きさと、木を薄く削ったような形状をしています(図3)。特に6月から9月によく見られます。幼虫期間は基本的に2年間で、3年目の夏季に成虫になって出てきます。成虫は6月から8月頃にみられます。

(3) 樹皮の亀裂やめくれのあるところに産卵します。産卵数が非常に多く、1匹の雌が1,000個以上の卵を産むこともあります。

(4) モモ、スモモ、ウメ、サクラ等のバラ科樹木に寄生します。幼虫は幹の表面から少し内側にある内樹皮の部分を加害します。樹幹が全周にわたり加害されると樹木が枯死します。

6 成虫や被害を発見した場合の注意事項

(1) 農地で成虫や被害が疑われる樹木を発見した場合は、病虫害防除所(電話0598-42-6365)にご連絡ください。

街路樹や公園などで被害樹を発見した場合は、情報収集フォームに情報をお寄せください。

クビアカツヤカミキリ発見情報収集フォーム

URL : <https://logoform.jp/form/8vMX/809346>

※パソコン、スマートフォンから入力できます。



7 防除対策および注意事項

- (1) 成虫を発見した場合は、直ちに捕殺してください。外来生物法により、生きたまま持ち運ぶことは違法とされています。
- (2) 成虫の脱出、分散を防ぐため、被害樹を発見した場合は、目合い4mm以下のネットを地際部から1から2m程度の高さまで2重に巻き付けてください。
- (3) 防除法には、被害樹の伐採、フラス排出孔への薬剤注入、成虫を対象とした薬剤散布などがあります。詳細については、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所の「クビアカツヤカミキリの防除法」で確認できます。

URL : <https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseika/5th-chuukiseika12.html>



図1 クビアカツヤカミキリ成虫
※三重県林業研究所撮影



図2 フラス（被害樹：ウメ）



図3 フラス（拡大）

8 問い合わせ先

三重県病虫害防除所：電話 0598-42-6365