

野生いのししの豚熱免疫獲得率(3か月移動平均、過去1年分)

R7.1月	R7.2月	R7.3月	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	
20.7%	22.5%	25.3%	18.3%	18.1%	17.7%	22.7%	16.6%	14.3%	11.2%	11.0%	14.4%	15.3%	北勢地域
14.3%	15.2%	25.0%	35.1%	38.6%	55.6%	51.5%	50.4%	39.2%	30.8%	25.5%	28.2%	28.5%	伊賀・名張地域
14.4%	16.8%	23.0%	30.0%	38.0%	56.0%	48.3%	39.6%	30.5%	28.1%	33.0%	32.2%	34.1%	中勢地域
17.7%	19.5%	25.9%	35.2%	35.6%	31.4%	23.3%	18.5%	17.8%	23.6%	28.7%	33.1%	34.9%	南勢地域
12.3%	16.7%	16.4%	16.7%	13.8%	12.7%	10.4%	10.7%	10.6%	14.5%	19.3%	22.5%	26.7%	東紀州地域
15.9%	18.2%	23.7%	28.9%	30.6%	33.4%	30.3%	23.2%	19.4%	21.0%	24.9%	28.0%	30.1%	三重県全域

※免疫獲得は、野外抗体と経口ワクチン抗体を区別していません。
 ※数値にばらつきがあるため、その月を含む3か月間の平均で集計しています。