


# 学校感染症情報

## 症候群サーベイランスシステムについて


三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。  
津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。






令和8年2月月報  
インフルエンザ



- 保育園
- 幼稚園
- こども園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 小・中一貫
- 中・高一貫
- その他

令和8年 2月報(インフルエンザを除く)



- 保育園
- 幼稚園
- こども園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 小・中一貫
- 中・高一貫
- その他



少しずつ報告が増えています

## 感染性胃腸炎

家族におなかの調子の悪い人がいるときは、トイレの**ドアノブ**などを介して病原体が拡がります。意識して手を洗いましょう！

### ●病原体と潜伏期間

ノロウイルス・・・12～48時間

ロタウイルス・・・1～3日

### ●症状

嘔吐と下痢が主な症状で、発熱・吐き気・腹痛などがみられます。ロタウイルスが原因の場合は、白い下痢便が出ることもあります。

多くは2～7日で治りますが、脱水症状を起こして重症化することがありますので、脱水に対する予防や治療が大切です。

### ●感染経路

ウイルスで汚染された水や食物、患者の吐物や便から飛び散ったウイルスが口から入り感染します。トイレの便座やドアノブに触れた場合は、手を介して口に入ります。

### ●予防のポイント

トイレの後や食事の前には必ずせっけんを使用して30秒ほどかけて手を洗いましょう。また吐物や下痢便の処理には手袋を装着し、手袋を脱いでからも手洗いをしましょう。

### ●衣類が便や吐物で汚染した場合

便や吐物を取り除いてから家庭用塩素系漂白剤でつけおき消毒した後、他の衣類と分けて洗濯しましょう。アルコールなどの消毒薬は効果がありません！