


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- ・水深 2m の水温は、鳥羽海域では 24～25℃台、的矢湾では 25℃台でした。
- ・水深 2m の日平均水温は、9 月初旬以降安定しており、25～26℃の間を推移しています。
- ・珪藻類は鳥羽海域の一部の海域で多く、桃取・上手では 1,000 細胞/mL を超えています。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ヶ所
月日		9/25								9/24	
時刻		9:11	9:29	9:52	10:01	10:22	10:28	10:34	11:23	9:08	10:05
水深 (m)		12.9	9.4	12.2	17.0	8.8	7.7	7.8	9.4	10.1	7.8
水温 (°C)	0.5m	25.1	25.1	25.1	25.0	25.0	25.0	25.5	24.8	24.9	25.2
	2m	25.1	25.0	25.1	25.0	25.1	25.1	25.3	24.9	25.1	25.1
	5m	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	25.0	25.1	25.1
	B-1m	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	25.0	25.3	25.2
塩分 (ppt)	0.5m	29.2	30.0	30.2	30.5	29.8	28.6	26.7	29.5	26.1	26.8
	2m	29.2	30.1	30.2	30.6	30.1	29.9	29.8	29.7	27.1	27.2
	5m	29.2	30.4	30.3	30.8	31.4	31.4	31.0	31.1	27.5	27.6
	B-1m	29.5	30.6	30.3	31.7	31.6	31.7	31.4	31.6	30.8	27.8
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	6.7	5.9	5.9	5.8	6.1	5.8	5.5	6.1	6.6	6.6
	2m	6.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	5.5	6.0	6.6	6.6
	5m	6.6	5.5	5.8	5.8	5.8	5.4	5.3	5.9	6.5	6.7
	B-1m	6.3	5.4	5.7	5.6	5.6	5.4	4.6	5.6	4.3	6.4
珪藻類 (細胞/mL)	2m	2,640	820	930	1,480	250	610	870	120	70	510

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始まります。