
カキ養殖漁場環境・モニタリング速報


令和８年１０月３０日

鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県



【概　況】

・水深 2m の水温は、鳥羽海域で 21℃台、的矢湾で 22～23℃台でした。
・水深 2m の日平均水温は気温に伴い徐々に低下しています。
・珪藻類は 10 月前半と比べると全体的に少なくなっています。



【結　果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ケ所
月日		10/29								10/19	
時刻		9:17	9:35	9:51	10:02	10:19	10:25	10:32	11:07	9:14	10:39
水深 （m）		14.1	10.6	13.0	18.9	9.7	8.7	8.7	9.4	10.6	8.5
水温 （℃）	0.5m	21.3	20.8	21.6	21.7	21.3	21.3	21.4	21.4	23.0	23.2
	2m	21.3	21.7	21.6	21.7	21.3	21.4	21.4	21.4	22.9	23.1
	5m	21.3	21.7	21.6	21.7	21.4	21.2	21.6	21.6	23.0	23.3
	B-1m	21.5	21.9	21.6	22.0	21.9	21.4	21.8	21.8	23.1	23.3
塩分 （ppt）	0.5m	30.1	29.5	30.6	31.0	30.8	30.9	30.9	30.9	32.1	31.9
	2m	30.3	30.5	30.6	31.0	30.8	30.9	31.0	31.0	32.1	32.1
	5m	30.4	30.7	30.6	31.0	31.2	31.1	31.3	31.3	32.3	32.5
	B-1m	30.7	31.0	30.6	31.7	31.8	31.4	31.5	31.6	32.4	32.6
溶存酸素量 （mg/L）	0.5m	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.7	6.7	6.9	7.0
	2m	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7
	5m	6.7	6.5	6.5	6.6	6.3	6.3	6.6	6.6	6.8	6.3
	B-1m	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.3	6.6	6.6	6.4	5.5
珪藻類 （細胞/mL）	2m	690	470	510	340	510	60	200	160	600	1,080

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。（例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です）
溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。