カキ養殖漁場環境・モニタリング速報

令和８年１１月１８日

鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県



【概　況】

・水深 2m の水温は、鳥羽海域で 18～19℃台、的矢湾で 18℃台でした。
・水深 2m の日平均水温は気温に伴い徐々に低下しています。
・珪藻類は両海域で少ない状態となっています。



【結　果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ケ所
月日		11/11								11/13	
時刻		9:13	9:28	9:45	9:54	10:09	10:14	10:20	10:39	9:19	9:47
水深 （m）		14.6	10.2	13.2	19.1	9.4	8.7	8.3	10.2	11.0	8.8
水温 （℃）	0.5m	18.3	18.4	18.8	19.0	18.6	18.7	17.9	18.8	18.2	18.0
	2m	18.3	18.5	18.8	19.0	18.7	18.7	18.0	18.8	18.6	18.1
	5m	18.3	18.9	18.8	19.0	18.8	18.6	18.3	18.9	18.7	18.3
	B-1m	18.4	18.9	18.8	19.0	18.6	18.6	18.3	19.1	18.6	18.5
塩分 （ppt）	0.5m	31.3	31.4	31.8	32.0	32.0	32.0	31.8	32.1	32.5	32.4
	2m	31.3	31.5	31.8	32.0	32.1	32.0	31.8	32.1	32.8	32.7
	5m	31.3	31.8	31.8	32.0	32.2	32.0	32.0	32.3	32.9	32.8
	B-1m	31.4	31.8	31.8	32.1	32.3	32.2	32.1	32.4	33.1	33.0
溶存酸素量 （mg/L）	0.5m	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.3
	2m	7.1	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.4
	5m	7.1	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2
	B-1m	7.1	6.9	6.9	6.9	6.7	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8
珪藻類 （細胞/mL）	2m	0	30	0	20	50	0	0	20	70	100

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。（例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です）
溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。